



NEBEZPEČÍ

BIODIČNÍ PŘÍPRAVEK, RODENTICID, TP 14

Složení:

100 g přípravku obsahuje:
Difenakum (N°CAS 56073-07-5) 0,005 g (50 mg/kg)
Denatonium benzoat (CAS No. 3734-33-6) 0,001 g
Potravní návnada (ochucovadla do 100 g

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

ČÍSLO POVOLENÍ: CZ-0021761-0000

DRŽITEL POVOLENÍ:

Colkim s.r.l., Via Piemonte, 50-40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie - Tel. 051799445

VÝROBCE:

Colkim s.r.l., Via Piemonte, 50-40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie - Tel. 051799445

Distributor v ČR:

SLOM, s.r.o., Staromlynská 47, 760 01 Zlín - Příluky, Tel./fax: +420 774 736 855, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

Balení:

balení o hmotnosti 10 kg obsahující parafinové bloky o váze 20 g.

OBALOVÝ MATERIÁL: plastový kompozit, plast, lepenka

Číslo šarže/datum: 301123 - 02/2020

DOBA POUŽITELNOSTI:

2 roky od data výroby uvedeném na obalu

INFORMACE PRO LÉKÁŘE: Tento přípravek obsahuje antikoagulant difenakum. Při požití lidmi se mohou příznaky otravy opozdit a mohou zahrnovat krvácení z nosu nebo dásní. Ve vážných případech se mohou objevit modřiny a krev ve stolici a moči

Antidotum: Vitamin K1 aplikovaný pouze lékařem při zasažení lidí nebo veterinárním lékařem při zasažení domácích a hospodářských zvířat.

PŘVNÍ POMOC: Při kontaminaci kůže: Omyjte zasažení místem vodou a pak mýdlem a vodou. V případě podráždění a/ nebo přetrvávající bolesti vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Postižené oči vyplachujte nejméně 15 minut roztokem na vyplachování očí nebo vodou s otevřenými víčky. (vyjměte kontaktní čočky). V případě podráždění a/ nebo přetrvávající bolesti vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. **Vdechování:** nejsou relevantní informace. **Při kontaminaci úst:** Vypláchněte důkladně ústa vodou. Nepodávejte nic úst osobám v bezvědomí. **Nevyvolávejte zvracení. Při požití:** Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte obal, etiketu nebo bezpečnostní list. Dojde-li k požití domácího mazlíčka, nebo hospodářského zvířete, kontaktujte veterinárního lékaře.

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALEHÁVE SITUACE: Toxikologické informační středisko - Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 - tel. 224 915 293 a 224 915 402

TECHNICKÉ INFORMACE: RATKILL BLOX je deratizačním přípravkem obsahujícím antikoagulant difenakum, který je účinný na myši domácí (Mus musculus), potkan (Rattus norvegicus) a krysy (Rattus rattus) již po jednorázovém požití. Přípravek má podobu voskových bloků a je určen k hubení uvedených hlodavců. Přípravek nevyvolává odpor u hlodavců, kteří jej požívají ani podezření u ostatních příslušníků populace. **RATKILL BLOX** může být aplikován uvnitř budov (včetně skládů a prodejen), v bezprostředním okolí průmyslových a obytných budov, vřel, sklepů, garáží, zahrad a okolních areálů, na venkovních skládkách odpadu a v kanalizační síti.

Cílové druhy hlodavců: Myši domácí (Mus musculus), dospělci i mláďata - Potkan (Rattus norvegicus), dospělci i mláďata - Krysa (Rattus rattus), dospělci i mláďata

ZPŮSOB APLIKACE: RATKILL BLOX je deratizačním přípravkem, v podobě voskových bloků, určeným k přímému použití. Přípravek může být aplikován pouze v deratizačních stanicích odolných proti násilnému otevření, chráněných přípravkem před okolním vlivem před lidmi, nečlověky organismy a zamezujících kontaminaci životního prostředí nebo na krycích a chráněných nástrahových místech, pokud poskytují stejnou úroveň ochrany lidem a nečlověky druhům jako deratizační stanice odolné proti násilnému otevření. Přípravek lze aplikovat přímo do nor hlodavců, vždy však tak, aby se snížila možnost kontaktu dětí a zasažení nečlověky druhů.

Účelové druhy hlodavců: Myši domácí (Mus musculus), dospělci i mláďata - Potkan (Rattus norvegicus), dospělci i mláďata - Krysa (Rattus rattus), dospělci i mláďata

NÁVOD K POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte etiketu a bezpečnostní list přípravku a všechny další informace výrobce a řiďte se jimi. Před aplikací tohoto přípravku proveďte průzkum celé oblasti, kde má být deratizace provedena. Určete důvody hlodavců/hlodavců, rozsah a sílu zamoření, najděte místa aktivy hlodavců, vyplňte místa polohy přípravku a získejte pravděpodobné příčiny zamoření. Odstraňte, pokud možno snadno přístupné zdroje potravy hlodavců. Místo deratizace však příliš neuklízte a neupravujte, aby nedošlo k přilícení vyvolání populace hlodavců, což by mohlo způsobit snížení příjmu deratizačního přípravku. Přípravek se smí používat pouze v rámci integrovaného systému ochrany (IPM), který zahrnuje hygienická opatření a pokud možno i fyzikální metody kontroly. Zvažte preventivní opatření, například: přerušení přístupových cest hlodavců, možnost odstranění všech zdrojů potravy a vody apod., za účelem zvýšení množství spotřebovaného deratizačního přípravku a omezení opětovného zamoření hlodavců.

Deratizační stanice a nástrahová místa musí být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla dříve pozorována aktivita hlodavců (např. čističky, hnízda, vstupy do nor, pronikání do objektů, příjem potravy a vody atd.). Přípravek je nutné zajistit tak, aby jej nebylo možné z deratizační stanice odtrhnout. Pokud je to možné, připevněte deratizační stanici k podlažce nebo k nějakému zařízení a předmětu. Deratizační stanice musí být zjevně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují deratizační přípravek a že nesmí být přemísťovány ani otevřeny. Deratizační stanice je nutné chránit před rozlišením deratizace přemísťováním na místa, kde byla zjištěna nová aktivita hlodavců.

Pokud je deratizační přípravek umístěn mimo budovu, musí být chráněn před povětrnostními vlivy a musí být umístěn tak, aby se minimalizovalo riziko otravy nečlověky organismů. Je-li přípravek poškozen ve veřejných prostorách, musí být deratizační stanice označeny a v okolí deratizačních stanic musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko přímými nebo sekundárními otravami antikoagulantem, spojené s uvedením opatření první pomoci v případě otravy. Deratizační stanice je nutné umístit mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných nečlověky druhů. Neumísťujte deratizační stanice s přípravkem do blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani v blízkosti míst, které s nimi přicházejí do kontaktu. Během manipulace s přípravkem nosťte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám. Při používání přípravku nejzte, nepijte a nekurte. Po použití přípravku s umyté ruce a přímou zasaženou pokožku. Pokud je spotřebovaný přípravek zjevně mimo rozsah zamoření nízký, zvažte přemísťování přípravku na jiná místa a možnost použití jiného typu přípravku. Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále ke zjevnému spotřebování přípravku a není zaznamenán žádný pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu. Po vyloučení jiných možností je pravděpodobné, že hlodavci jsou rezistentní, zvažte tedy použití jiného než antikoagulačního rodenticidu, pokud je k dispozici, případně atraktivnějšího přípravku s antikoagulanty. Zvažte rovněž alternativní regulaci hlodavců pomocí pastí.

Po skončení deratizace odstraňte všechny deratizační stanice s přípravkem, případně jeho rozlišení zbytků a uhybné hlodavce.

Přípravek je nebezpečný pro volně žijící živočichy.

RODENTICIDES

Rodenticidi



RATKILL BLOX

Deratizační nástraha v podobě voskových bloků k přímému použití.

Použití: profesionální
Místa použití: Uvnitř budov a v jejich okolí, venkovní skládky odpadu, kanalizace

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOBY APLIKACE:

Použití uvnitř budov proti myši domácí (Mus musculus), potkanu (Rattus norvegicus) a kryse (Rattus rattus)

Myši domácí: umístěte 40 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice.

Potkan a krysa: v případě silného zamoření umístěte 60-100 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice.

V případě nízkého zamoření umístěte 40-60 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice.

V případě trvalého polohy deratizačního přípravku umístěte 60-100 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice. Deratizační stanice s nástrahou by měly být kontrolovány při hubení myši domácích nejméně každé 2 až 3 dny, při hubení potkanů a krys každých 5 až 7 dní, na začátku deratizace a poté nejméně jednou týdně, zda je nástraha přijímána, stanice s nástrahou jsou neponořené a případně, zda je třeba odstranit těla uhybných hlodavců. Při kontrole je nutné nástrahu doplnit a vyměnit, pokud byla poškozena nebo jinak znehodnocena. Na konci deratizačního zásahu odstraňte všechny zbytky přípravku. Při trvalém polohy přípravku a pokud je to možné, kontroly deratizovanou oblast a deratizační stanice minimálně každé 4 týdny. Dodržujte všechny další pokyny vyžadované osvědčenými metodikami. Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace všechny osoby a instituce, kterých se deratizace může týkat, (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o hubení hlodavců. Proveďte opatření, která podpoří přijímání otravy, vyhledejte a sbírejte během deratizačního zásahu uhybné hlodavce nejméně jednou týdně. Je-li zapotřebí více než jedna deratizační stanice, umístěte ji ve vzdálenosti přibližně 5-10 metrů od sebe, přičemž minimální vzdálenost je 5 metrů.

Trvalé polohy deratizačního přípravku RATKILL BLOX je možné jen v místech, kde prokazatelně dochází k trvalému pronikání hlodavců z okolí a kde se ostatní způsoby ochrany před pronikáním hlodavců ukázaly jako neúčinné. Strategie trvalé polohy deratizačního přípravku musí být pravidelně přehodnocována v rámci strategie integrované ochrany proti škůdcům (IPM).

V případě umístění deratizačního přípravku v blízkosti vody a kanalizačních systémů, zabráněte kontaktu návnady s vodou.

Použití venku v okolí budov proti myši domácí (Mus musculus), potkanu (Rattus norvegicus) a kryse (Rattus rattus).

Myši domácí: umístěte 40 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice.

Potkan a krysa: v případě silného zamoření umístěte 60-100 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice.

V případě nízkého zamoření umístěte 40-60 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice. V případě trvalého polohy deratizačního přípravku umístěte 60-100 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice. Na konci deratizačního zásahu odstraňte všechny zbytky přípravku. Při aplikaci přímo do nor musí být přípravek umístěn tak, aby se minimalizovalo vystavení nečlověky druhů. Deratizační stanice s nástrahou by měly být kontrolovány při hubení myši domácích nejméně každé 2 až 3 dny, při hubení potkanů a krys každých 5 až 7 dní, na začátku deratizace a poté nejméně jednou týdně, zda je nástraha přijímána, stanice s nástrahou jsou neponořené a případně, zda je třeba odstranit těla uhybných hlodavců. Při kontrole je nutné nástrahu doplnit a vyměnit, pokud byla poškozena nebo jinak znehodnocena. Na konci deratizačního zásahu odstraňte všechny zbytky přípravku. Při trvalém polohy přípravku a pokud je to možné, kontroly deratizovanou oblast a deratizační stanice minimálně každé 4 týdny. Dodržujte všechny další pokyny vyžadované osvědčenými metodikami. Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace všechny osoby a instituce, kterých se deratizace může týkat, (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o hubení hlodavců. Proveďte opatření, která podpoří přijímání otravy, vyhledejte a sbírejte během deratizačního zásahu uhybné hlodavce nejméně jednou týdně. Je-li zapotřebí více než jedna deratizační stanice, umístěte ji ve vzdálenosti přibližně 5-10 metrů od sebe, přičemž minimální vzdálenost je 5 metrů.

Trvalé polohy deratizačního přípravku RATKILL BLOX je možné jen v místech, kde prokazatelně dochází k trvalému pronikání hlodavců z okolí a kde se ostatní způsoby ochrany před pronikáním hlodavců ukázaly jako neúčinné. Strategie trvalé polohy deratizačního přípravku musí být pravidelně přehodnocována v rámci strategie integrované ochrany proti škůdcům (IPM). Nutné je zvažít provedení deratizace i v okolních ohniskách výskytu hlodavců. V případě umístění deratizačních stanic v blízkosti povrchových vod (např. řek, rybníků, vodních kanálů, hrází, zavlažovacích příkopů apod.), zabráněte kontaktu přípravku s vodou.

Použití venkovní, na otevřených plochách a skládkách proti potkanům (Rattus norvegicus) a a krysám (Rattus rattus)

Potkan a krysa v případě silného zamoření umístěte 60-100 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice. V případě nízkého zamoření umístěte 40-60 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice. V případě trvalého polohy deratizačního přípravku umístěte 60-100 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice.

Chráně deratizační stanice a přípravkem před povětrnostními podmínkami. Deratizační stanice s přípravkem umístěny jen na místa, která nejsou a pokud možno ani nikdy nebudou, zaplavována vodou. Vyměňte přípravek v deratizačních stanicích, když byl poškozen vodou nebo jinak znečištěn. Na konci deratizačního zásahu seberte všechny zbytky deratizačního přípravku s přípravkem a seberte případně rozsypaný přípravek. Dodržujte všechny další pokyny vyžadované osvědčenými metodikami. Při trvalém polohy přípravku kontroly deratizovanou oblast a deratizační stanice minimálně každé 4 týdny. Deratizační stanice s nástrahou by měly být kontrolovány při hubení myši domácích nejméně každé 2 až 3 dny, při hubení potkanů a krys každých 5 až 7 dní, na začátku deratizace a poté nejméně jednou týdně, zda je nástraha přijímána, stanice s nástrahou jsou neponořené a případně, zda je třeba odstranit těla uhybných hlodavců. Při kontrole je nutné nástrahu doplnit a vyměnit, pokud byla poškozena nebo jinak znehodnocena. Na konci deratizačního zásahu odstraňte všechny zbytky přípravku. Při trvalém polohy přípravku a pokud je to možné, kontroly deratizovanou oblast a deratizační stanice minimálně každé 4 týdny. Dodržujte všechny další pokyny vyžadované osvědčenými metodikami. Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace všechny osoby a instituce, kterých se deratizace může týkat, (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o hubení hlodavců. Proveďte opatření, která podpoří přijímání otravy, vyhledejte a sbírejte během deratizačního zásahu uhybné hlodavce nejméně jednou týdně. Je-li zapotřebí více než jedna deratizační stanice, umístěte ji ve vzdálenosti přibližně 5-10 metrů od sebe, přičemž minimální vzdálenost je 5 metrů.

Trvalé polohy deratizačního přípravku RATKILL BLOX je možné jen v místech, kde prokazatelně dochází k trvalému pronikání hlodavců z okolí a kde se ostatní způsoby ochrany před pronikáním hlodavců ukázaly jako neúčinné. Strategie trvalé polohy deratizačního přípravku musí být pravidelně přehodnocována v rámci strategie integrované ochrany proti škůdcům (IPM). Nutné je zvažít provedení deratizace i v okolních ohniskách výskytu hlodavců. V případě umístění deratizačních stanic v blízkosti povrchových vod (např. řek, rybníků, vodních kanálů, hrází, zavlažovacích příkopů apod.), zabráněte kontaktu přípravku s vodou.

Použití v kanalizaci proti potkanům (Rattus norvegicus)

V případě vysokého zamoření umístěte 100 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice nebo na každé nástrahové místo. V případě nízkého zamoření umístěte 60 g přípravku RATKILL BLOX do každé deratizační stanice nebo na každé nástrahové místo. V případě trvalého polohy deratizačního přípravku umístěte 60-100 g RATKILL BLOX do každé deratizační stanice nebo na každé nástrahové místo. Přípravek musí být aplikován takovým způsobem, aby se nedostal do styku s vodou a nebyl splavena.

Přípravek může být aplikován pouze v deratizačních stanicích odolných proti násilnému otevření nebo na krycích a chráněných nástrahových místech, pokud poskytují stejnou úroveň ochrany nečlověky druhům a lidem jako deratizační stanice odolná proti násilnému otevření. Umístěte nástrahy pouze do kanalizačních systémů, které jsou napojeny na čistící odpadní vod. Jestliže je potřeba položit větší počet deratizačních stanic nebo nástrahových míst, umístěte je v minimální vzdálenosti 5 m od sebe. Trvalé polohy deratizace je přísně omezeno na místa s vysokým potenciálem opětovného výskytu, pokud se jiné metody regulace ukázaly jako nedostatečné. Strategie trvalé polohy přípravku musí být pravidelně přehodnocována v rámci integrované ochrany proti škůdcům a posouzení rizika opětovného zamoření. Nutné je zvažít provedení deratizace v okolních ohniskách výskytu hlodavců. Při trvalém polohy přípravku musí být přípravek poškozený vodou, kontaminovaný nečistotami nebo přípravkem spotřebovaný nahrazen po prvních 3 dnech, později nahrazenová a doplňován v intervalech 7 dní. Přitom je nutné sebrat vždy všechny přípravek, který se dostal mimo deratizační stanice a odstraňovat uhybné hlodavce. Chráně přípravek před vlivy prostředí a počasí, deštěm, sněhem apod. Přípravek pokládejte jen na místa, o nichž je možné předpokládat, že nebudou zaplaveny odpadovou vodou. Za účelem zjištění, zda je přípravek akceptován, zda stanice nejsou porušeny nebo odplaveny a za účelem odstraňování uhybných hlodavců, musí být prováděna kontrola v pravidelných intervalech. Spotřebovaný a poškozený přípravek musí být dohodován.

OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ RIZIK:

Při aplikaci přípravku RATKILL BLOX postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Některým nepoužívejte jako pulzní aplikaci nástrahy. Pokud je to možné informujte o připravované deratizaci všechny osoby a instituce, kterých se může její provádění, jakkoliv týkat. Aby se snížilo riziko druhových otrav odstraňujte hlodavce uhybné během deratizace v potřebných intervalech (např. dvakrát týdně).

Zabráňte, aby byl deratizační přípravek zasažen vodou, pokud jsou deratizační stanice umístěny v blízkosti vodních toků, rybníků, stoč, kanálů, kanalizace apod. Deratizační přípravek nemůže být v deratizované oblasti položen déle než 35 dní bez toho, aby nebyla znehodnocena síla zamoření a účinnost zásahu. Nepoužívejte deratizační přípravky s antikoagulanty k prevenci a monitorování výskytu hlodavců. Přípravek RATKILL BLOX by měl vyvolat hubě během 35 dní. Pokud je přípravek po této době stále spotřebováván a není pozorována snížení aktivity hlodavců, je nutné hledat příčinu. Je možné umístit deratizační stanice na jiná místa, zvýšit jejich počet, nikoliv však množství přípravku v nich, zvažt možnost rezistence hlodavců k antikoagulantům a použít deratizační přípravek jiné formulace nebo s jinou účinnou látkou a zvažt použití nechemických způsobů deratizace (pasti apod.).

Neumísťujte vodou deratizační stanice s přípravkem z deratizačních stanic, ani přípravek aplikovaný venku v krycích a chráněných nástrahových místech. Uhybné hlodavce likvidujte podle platné legislativy. Po skončení deratizace seberte všechny deratizační stanice s nespotebovaným přípravkem, seberte rozhozený přípravek a kontaminované obaly a likvidujte je jako nebezpečný odpad. Přípravek skládajte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzavíracích sádkách. Vyhnete se vystavení přímému slunečnímu záření. Ukládání a transport provádějte odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Zabezpečte přípravek tak, aby nebyl v dosahu dětí, ptáků a zvířat.

DALŠÍ INFORMACE:

Vlivem antikoagulantu (difenakum), který je účinnou látkou přípravku RATKILL BLOX, dochází k uhybnu za 4 až 10 dní po jeho požití hlodavci. Hlodavci jsou rezervuáři původců infekčních onemocnění lidí. Nedotýkejte se proto uhybných hlodavců rukama. S uhybnými hlodavci manipuluje jen v rukavicích nebo kleštěmi.

Tento přípravek obsahuje hořkou látku a varovné barvivo, které snižují možnost náhodného požití dětí.

Colkim

Colkim Srl - Via Piemonte 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. +39 051.799.445 - Fax +39 051.797.555