

PROTECT SENSATION®

Deratizační nástraha PROTECT SENSATION® je určena k přímému použití. Má podobu pevných bloků, tvořených čerstvou nástrahou uvnitř, pokrytou voskovou vrstvou. Přípravek obsahuje účinnou látku bromadiolon. Krycí vosková vrstva obsahuje navíc denatonium benzoát, což je pro lidi extrémně hořká látka bránící náhodnému pozření, zejména dětmi.

Biocidní přípravek: deratizační nástraha, TP 14

Účinná látka: 0,05 g/kg bromadiolonu

Deratizační nástraha PROTECT SENSATION® je určena pouze pro profesionální použití. Proti potkanům (*Rattus norvegicus*) ji lze používat uvnitř a v okolí budov, včetně veřejných prostorů, proti myši domácí (*Mus musculus*) uvnitř budov.

Číslo povolení: CZ-0018987-0000

Upozornění: Před použitím si důkladně přečtěte etiketu přípravku. Používání tohoto přípravku způsobem, který není v souladu s touto etiketou je v rozporu s legislativou.

Při práci s přípravkem používejte pracovní oděv, pracovní rukavice. Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Zabraňte kontaktu přípravku s očima, sliznicemi a kůží.

Před jídlem, pitím a kouřením a po skončení práce s přípravkem si umyjte ruce případně další části těla náhodně zasažené pokožky.

Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, nápojů, krmiv ani jejich obalů, ani ke kontaminaci kuchyňského náčiní.

Ve většině případů, by při použití nástrahy PROTECT SENSATION® mělo být dosaženo vyhubení hlodavců na ošetřené ploše do 35 dnů. Pokud budou hlodavci přežívat i po této době, měla by být určena pravděpodobná příčina. Zabraňte přístupu k nástraze dětem, nepovolaným osobám, ptákům a ostatním necílovým zvířatům (zejména psům, kočkám, prasatům a drůbeží).

V oblastech, kde je podezření na rezistenci hlodavců k bromadiolonu je vhodné použít nástrahu s jinou účinnou látkou. V případě, že není přípravek PROTECT SENSATION® na některé lokalitě pro hlodavce evidentně dostatečně atraktivní, použijte přípravek jiný, s jiným složením návnady a jinou účinnou látkou.

Pokud je přípravek PROTECT SENSATION® používán ve veřejných prostorech, ošetřené plochy musí být během zásahu označeny upozorněním, které vysvětluje riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulanty a upozorněním na nutná opatření, která mají být přijata v případě otrav. Deratizační staničky musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují deratizační nástrahu. Musí na nich být uveden zákaz manipulace a přemisťování, název, adresa a telefonní kontakty na firmu, která zásah provádí.

Údaje o nebezpečnosti:

H360D Může poškodit nenarozené dítě.

H372 Způsobuje poškození krevního systému při dlouhodobé nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201

Před použitím si obzarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si

nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a

neporozuměli jim. P262 Zabraňte styku s

očima, kůží nebo oděvem. P270 Při

používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani

nekuřte. P280 Používejte ochranné

rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + 310 PŘI POŽITÍ:

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P308 + 313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle

platné legislativy/pokynů uvedených v etiketě.



Nebezpečí

Aby nedošlo k ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, dodržujte pokyny pro použití.

Mechanismus účinnosti: Účinnou látkou přípravku PROTECT SENSATION® je bromadiolon, který patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, bromadiolon snižuje srážlivost jejich krve

a zvyšuje propustnost krevních cest. Hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek PROTECT SENSATION® působí uhybní hlodavců již při jednorázovém požití, je velmi dobře přijímán a úhyn hlodavců nastává 3 až 5 dní po požití přípravku. Přípravek proto nevyvolává obranný reflex.

Návod k použití: Použití deratizační nástrahy PROTECT SENSATION® nabízí několik následujících výhod: Nástraha je vždy čerstvá, chráněná voskovou vrstvou a je pro potkany i myši domácí vysoce atraktivní. Hlodavci se k ní dostanou jen když ukousnou voskovou vrstvu, což samo o sobě může vést ke konzumaci smrtelné dávky. Vnější vrstva vosku zvyšuje odolnost nástrahy proti okolním vlivům.

Bloky nástrahy lze snadno a bezpečně upevnit v deratizačních staničkách, což zabraňuje roznášení nástrahy hlodavci a tím se minimalizuje nebezpečí kontaminaci životního prostředí. Spotřeba nástrahy je snadno monitorovatelná a spotřebované množství je jednoduše měřitelné.

Deratizační nástrahu PROTECT SENSATION® aplikujte pouze na místa, kde se potkani a myši domácí vyskytují, nebo kam trvale pronikají. Nástrahu aplikujte pouze v komerčních deratizačních staničkách, které brání přístupu dětí, nepovolaných osob a necílových organismů k nástraze, přitom umožňují kontrolu a doplňování nástrahy během deratizačního zásahu, brání vynášení nástrahy hlodavci a chrání nástrahu před vlivy okolních podmínek.

Deratizační staničky by měly být připevněny k zemi, aby se zabránilo jejich nedovolenému přemísťování nebo zcizení. Staničky by měly být naplněny nástrahou již před rozmístěním. Před rozmístěním deratizačních staniček odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možnosti zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Při dávkování nástrahy PROTECT SENSATION® musí být zvážena síla zamoření a přesně vytypována místa častého výskytu a místa pronikání hlodavců do ošetřeného prostoru. Uvažována by měla být i možnost rezistence hlodavců.

Dávkování:

Myš domácí: 40 - 50 g nástrahy v deratizační staničce na každých 5 m² podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu. Rozmísťování deratizačních staniček s nástrahou PROTECT SENSATION® proti myši domácí je povoleno pouze ve vnitřních prostorách budov a staveb.

Potkan: 200 g nástrahy v deratizační staničce na každých 100 m² podlahové plochy ošetřeného prostoru. Přitom staničky umístějte především na místa, kde se potkani vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu. Deratizační staničky by měly být vzdáleny od sebe asi 10 metrů při slabším zamoření potkany, a jen 7 metrů při silnějším zamoření. Rozmísťování deratizačních staniček s nástrahou PROTECT SENSATION® proti potkanům je povoleno ve vnitřních prostorách budov a staveb a v jejich okolí.

Hynutí hlodavců začíná po 3-5 dnech od první spotřeby. Kontroly deratizačních staniček provádějte pravidelně každých 7 až 10 dní a znečištěnou nástrahu vyměňte, spotřebovanou nástrahu doplňte, nástrahu vynesenu z deratizačních staniček odstraňte. Je-li přítomnost hlodavců zřejmá a v některých deratizačních staničkách zůstala nástraha nedotčena, přemístěte tyto staničky na místa s výskytem hlodavců. Deratizační staničky kontrolujte a nástrahu doplňujte až do úplného vymizení hlodavců. Uhybnulá zvířata odstraňujte. Po vymizení hlodavců odstraňte všechny deratizační staničky s nástrahou, případně rozsypanou nástrahu sesbírejte a odstraňte všechny materiál použité v souvislosti s deratizačním zásahem.

První pomoc: V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. **Při vdechnutí:** Vdechnutí není pravděpodobné.

Při kontaktu s kůží: Odstraňte veškeré kontaminované oděvy a vyperte je dříve, než je použijete znovu. Umyjte zasaženou kůži velkým množstvím vody a mýdla. Pokud nějaké potíže přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Při zasažení očí: Držte oči otevřené pomoci prstů a důkladně je vyplachujte velkým množstvím vody po dobu několika minut. Pokud nosíte kontaktní čočky, okamžitě je odstraňte. Pokud symptomy přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Při polknutí Vzhledem k hořké chuti je polknutí málo pravděpodobné. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal, etiketu nebo bezpečnostní list přípravku. U postiženého vyvolávejte zvracení pouze tehdy, pokud vám to lékař doporučí. Postiženému důkladně vypláchněte ústa, ale nedávejte mu nic k jídlu ani k pití. Uložte jej na teplém místě a poraďte se s lékařem. Nevpravuje nic do úst osobě v bezvědomí. **V případě požití nebo podezření na požití okamžitě vyhledejte pro postiženého lékařskou pomoc!**

ANTIDOTUM: Vitamin K, (pod lékařským dohledem).

První pomoc a léčení je možné konzultovat s: Toxikologickým informačním střediskem (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, 24 hod. denně e-mail: tis@cesnet.cz

Nakládání s odpady: Během zásahu vyhledávejte a odstraňujte mrtvé hlodavce intervalech odpovídajících kontrolám deratizačních staniček. Za určitých okolností může být vyžadována denní kontrola. Zlikvidujte mrtvé hlodavce a zbytky přípravku v souladu s legislativou.

Skladování a skladovatelnost: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah potravin a krmiv. Uchovávejte v chladném, suchém, dobře větraném prostoru. Uchovávejte pouze v původním obalu.

Balení: 25 g bloky v polypropylenovém kbelíku – celková váha 8 kg

Výrobce a držitel povolení: Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.

1107 Budapest Szállás u. 6., Tel.: 06-1-43-20-400

E-mail: info@babolna-bio.com, Internet: www.babolna-bio.com

Distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Zlín – Příluky 760 01, Staromlýnská 47,

www.slom.cz, slom@slom.cz, tel.: 577 218 701

© = registrovaná značka

Doba použitelnosti do 2 let od data výroby.

Datum výroby na obalu: (den/měsíc/rok)

30.01.2020/146341

